




Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол женский Возраст 36

Показатель	Результат	Референсный интервал
Коагулологические исследования		
[00386] БЛОК: Базовая коагулограмма/гемостазиограмма + Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (АДФ) - кровь		
[00385] Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (АДФ) - кровь		
Принимаемые препараты	Клексан	
Тромбоциты, •10^9/л	303	150 - 400
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), фл	11,9	9 - 17
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), %	24,4	13 - 43
Тромбокрит (PCT), %	0,30	0,15 - 0,4
Агрегация с индуктором АДФ (конечная концентрация в ОТП - 20мкМ)		
Амплитуда с индуктором АДФ, %	78	60 - 90
Количество волн (АДФ)	1	
Заключение по агрегации с АДФ	Агрегационный ответ в референсном интервале. Дезагрегация отсутствует.	
Агрегация с индуктором АДФ		
		
[00248] Базовая коагулограмма/гемостазиограмма - кровь		
Принимаемые препараты	Клексан	
Гемоглобин, г/л	135	Женщины: 120 - 140
Эритроциты, •10^12/л	4,87	Женщины: 3,9 - 4,7
Гематокрит, л/л	0,41	Женщины: 0,36 - 0,42
Средний объем эритроцита (MCV), фл	84,0	Женщины: 75 - 95
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг	27,7	Женщины: 27 - 32
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), г/дл	33,0	32 - 36
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW-CV), %	13,2	11,5 - 14,5
Лейкоциты, •10^9/л	6,08	Женщины: 4 - 9
Тромбоциты, •10^9/л	303	150 - 400

Показатель	Результат	Референсный интервал
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), фл	11,9	9 - 17
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), %	24,4	13 - 43
Тромбокрит (PCT), %	0,30	0,15 - 0,4
Заключение по гемограмме	Показатели в пределах референсных интервалов	
Внешний путь свертывания крови		
Протромбиновое время, сек	11,9	9 - 15
Протромбин по Квику, %	133	85 - 139
МНО	0,86	0,8 - 1,25
Внутренний путь свертывания крови		
АЧТВ, сек	35,2	26 - 41
Образование фибриногена		
Фибриноген, г/л	2,6	Небеременные женщины: 2 - 4 Беременные женщины до 20 недель: 2 - 5,3 Беременные женщины 21-28 недель: 3 - 5,7 Беременные женщины 29-34 недели: 3,2 - 5,7 Беременные женщины 35-42 недели: 3,5 - 6,5
Внутрисосудистое свертывание крови и фибринолиз		
Заключение по плазменному звену гемостаза	Изокоагуляция	
Противосвертывающая система		
Антитромбин III, %	87,0	80 - 120
Активность противосвертывающей системы крови в пределах референсных интервалов		

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).
Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.