

Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол **женский** Возраст **34**
Д.п.м.

Показатель	Результат	Референсный интервал
Коагулологические исследования		
[01075] Тромбоэластограмма - кровь		
Принимаемые препараты	Курантил, Тромбо АСС	
Время реакции (R), мин	10,1	Женщины: 9 - 27 Беременность 1 триместр: 5,1 - 12,0 Беременность 2 триместр: 6,7 - 9,8 Беременность 3 триместр: 5,2 - 8,6
Кинетическое время (K), мин	1,8	Женщины: 2 - 9 Беременность 1 триместр: 1,0 - 2,8 Беременность 2 триместр: 1,1 - 2,0 Беременность 3 триместр: 1,1 - 1,8
Угол α (Angle α), градусы	65,3	Женщины: 22 - 58 Беременность 1 триместр: 52,9 - 74,3 Беременность 2 триместр: 62,0 - 73,5 Беременность 3 триместр: 64,9 - 75,2
Максимальная амплитуда (MA), мм	65,1	Женщины: 44 - 64 Беременность 1 триместр: 63,0 - 73,0 Беременность 2 триместр: 65,8 - 85,9 Беременность 3 триместр: 66,5 - 81,8
Прочность сгустка (G), дин/см ²	9,33	4,5 - 11
Коагуляционный индекс (CI)	1,73	-3,0 - +3,0
Процент лизиса сгустка через 30 мин после достижения MA (LY30), %	1,4	Женщины: 0 - 8 Беременность 1 триместр: 0 - 3,6 Беременность 2 триместр: 0 - 2,2 Беременность 3 триместр: 0 - 2,0
A30, мм	61,9	
A60, мм	56,3	
Процент лизиса сгустка через 60 мин после достижения MA (LY60), %	5,7	0 - 15
ТPI	51,8	3 - 20
ТМА, мин	28,6	
Максимальная эластичность сгустка (E), дин/см ²	186,5	72 - 169
SP, мин	9,2	
$\Delta = (R-SP)$, мин	0,9	
R (время реакции) - характеризует ферментативный этап коагуляции. Время реакции продлевается антикоагулянтами и дефицитом факторов свертывания и укорачивается в условиях гиперкоагуляции. K (кинетическое время) - характеризует кинетику увеличения прочности сгустка. Кинетическое время сокращается при повышенном уровне фибриногена и, в меньшей степени, при повышенном тромбогенезе и продлевается с помощью антикоагулянтов, влияющих на оба условия. Angle α (угол α) - характеризует уровень фибриногена в плазме. MA (максимальная амплитуда) - характеризует максимум динамических свойств соединения фибрина и тромбоцитов посредством GPIIb/IIIa и отображает максимальную прочность сгустка. LY30 - характеризует процесс растворения сгустка (лизис). Комплексные анализы на гемостаз должны интерпретироваться врачом с учетом срока беременности и принимаемых препаратов. Референсные интервалы при беременности даются по триместрам по базовым показателям. Все остальные показатели являются расчетными. Признаки гиперкоагуляции по расчетным показателям обычно не указывают на патологию.		

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).

Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.

Citrated native

