



Результаты исследований

Пациент

Пол женский

Возраст 38

Заказ

Показатель		Результат		Референсный интервал	
Молекулярно-генетические исследования					
[01157] Полиморфизм FVII -312ins10 (rs5742910) - буккальный эпителий					
Гены тромбофилии					
Ген	Кодируемый белок	Полиморфизм	Локализация	Результат	Шифр
F7	VII коагуляционный фактор	A1/A2 (rs5742910)	с.-323	A1/A1	1*
В активном состоянии фактор VII взаимодействует с фактором III, что приводит к активации факторов IX и X системы свертывания крови, то есть коагуляционный фактор VII участвует в образовании кровяного сгустка. Данный полиморфизм включает вставку в 10 п.н. в положении -323 в области промотора гена F7. Аллель A1 означает отсутствие вставки, а аллель A2 - наличие. У пациентов с генотипом A2A2 активности активированного фактора VII снижена на 66%. Частота аллелей: A2 (insCCTATATCCT)=0.20489 Ориентация цепи: плюс Синонимы: N/ins * - защитный аллель является более редким. Шифр: 1 - гомозигота частый аллель, 2 - гетерозигота, 3 - гомозигота редкий аллель					

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).

Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.