



Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол мужской Возраст 28

Показатель	Результат	Референсный интервал
HLA-типирование		
[01225] HLA типирование 1 и 2 класса: HLA - типирование 1 класса (локусы A, B, C) на низком (групп-аллельном) уровне разрешения / HLA-типирование 2 класса DRB1, DQA1, DQB1 - буккальный эпителий		
[00601] HLA - типирование 1 класса (локусы A, B, C) на низком (групп-аллельном) уровне разрешения - кровь		
Альфа-блок		
HLA-A	*02	
HLA-A	*03	
Бета-блок		
HLA-B	*35	
HLA-B	*35	
HLA-C	*04 [группа C2]	
HLA-C	*04 [группа C2]	
Заключение HLA		
HLA A*29	Не обнаружено	
HLA B*27	Не обнаружено	
HLA B*51	Не обнаружено	
Наличие варианта A*29 ассоциировано с развитием хориоретинопатии birdshot (одна из форм заднего увеита). Вариант B*27 ассоциирован с развитием анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева) и других связанных серонегативных спондилоартропатий. Вариант B*51 ассоциирован с болезнью Бехчета (хроническое воспалительное мультисистемное заболевание с развитием васкулита артерий и вен).		
[00342] HLA-типирование 2 класса DRB1, DQA1, DQB1 - буккальный эпителий		
Гаплотип* 1, частота	DRB1*01:01; DQA1*01:01; DQB1*05:01; частое сцепление	
Гаплотип* 2, частота	DRB1*11:01; DQA1*05:05; DQB1*03:01; частое сцепление	
Серологическая специфичность 1	DR1-DQ5.1	
Серологическая специфичность 2	DR11(5)-DQ7.5	
Дельта-блок		
DRB1	*01:01-04	
DRB1	*11:01/04/05	
DQA1	*01:01/04/05/07/12	
DQA1	*05:01-20	
DQB1	*05:01/07	
DQB1	*03:01	
* - наиболее вероятные сцепления. При «похожести» генов тканевой совместимости, речь идет о совпадениях по гаплотипу. Гаплотипы - это сочетания вариантов антигенов тканевой совместимости (HLA), которые наследуются в связке из поколения в поколение. Например, DRB1*01; DQA1*0101; DQB1*0501. Гаплотипы встречаются с разной частотой. Например, гаплотип DQB107, DQA102 и DQB1*02 встречается у 14% населения. При совпадениях в супружеской паре чаще всего наблюдается сочетание двух частых гаплотипов или частого гаплотипа и редкого гаплотипа. И крайне редко - сочетание двух редких гаплотипов. При наличии совпадений по гаплотипам между мужем и женой повышается частота невынашивания беременности; увеличивается интервал между началом половой жизни и наступлением первой беременности, увеличиваются интервалы между беременностями. Получить консультацию и пройти обследование можно в Центре иммунологии и репродукции.		

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).
Записаться на приём к врачу: cironline.ru




Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.