


Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол женский Возраст 31

Показатель	Результат	Референсный интервал
Биохимические исследования крови		
[00470] Метаболический блок, с препаратом (со стоимостью забора крови) - сыворотка		
Рост, см	175,0	
Вес, кг	71,5	
ИМТ (индекс массы тела)	23	16 и менее - выраженный дефицит массы тела 16—18,49 - недостаточная (дефицит) масса тела 18,5—24,99 - норма 25—29,99 - избыточная масса тела 30—34,99 - ожирение 1 степени 35—39,99 - ожирение 2 степени 40 и более - ожирение 3 степени (согласно ВОЗ 2004)
Индекс инсулинорезистентности HOMA1-IR, %	1,01	Инсулинорезистентность отсутствует: < 2,0 Повышенный риск резистентности к инсулину: > 2,0 Инсулинорезистентность: > 2,5
Индекс инсулинорезистентности HOMA1-β, %	64,79	>48,9
Индекс QUICKI	0,38	>0,317
Индекс Caro	1,07	>0,33
Индекс MATSUDA	5,85	Чувствительность к инсулину в норме: >6 Чувствительность к инсулину снижена (пограничное значение): 4-6 Патологическое снижение чувствительности к инсулину: <4
Натощак		
С-пептид, нг/мл	1,04	0,9 - 7,1
ЛПВП, ммоль/л	1,53	>0,9
ЛПНП, ммоль/л	2,40	0 - 4,1
Триглицериды, ммоль/л	0,81	0 - 1,71
Холестерин, ммоль/л	4,29	0 - 6,21
Индекс атерогенности	1,80	Женщины 30 - 40 лет: < 3,0
Натощак		
Глюкоза, ммоль/л	4,92	3,5 - 5,8
Инсулин, мМЕ/л	4,60	2,6 - 27
После нагрузки		
Глюкоза через час после нагрузки, ммоль/л	8,86	< 10
Инсулин через час после нагрузки, мМЕ/л	59,40	
После нагрузки		
Глюкоза через два часа после нагрузки, ммоль/л	5,59	< 7,8

Метаболический блок. Глюкоза.



Состояние	Глюкоза, ммоль/л
Натощак	4,92
Через 1 час	8,86
Через 2 часа	5,59




Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.