Результаты исследований

Пациент

Заказ

Пол **женский** Возраст **40**

Показатель	Результат	Референсный интервал
Коагулологические исследования		
[00386] БЛОК: Базовая коагулограмма/гемостазиограмма + Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (АДФ) - кровь		
[00385] Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (АДФ) - кровь		
Тромбоциты, •10^9/л	329	150 - 400
Агрегация с индуктором АДФ (конечная концентрация в ОТП - 20мкМ)		
Амплитуда с индуктором АДФ, %	76	60 - 90
Количество волн (АДФ)	1	
Заключение по агрегации с АДФ	Агрегационный ответ в референсном интервале. Дезагрегация отсутствует.	

Агрегация с индуктором АДФ



[00248] Базовая коагулограмма/гемостазиограмма - кровь		
Гемоглобин, г/л	**114**	Женщины: 120 - 140
Эритроциты, •10^12/л	**3,86**	Женщины: 3.9 - 4.7
Гематокрит, л/л	**0,33**	Женщины: 0.36 - 0.42
Средний объём эритроцита (MCV), фл	85,2	Женщины: 75 - 95
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг	29,5	Женщины: 24 - 34
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), г/дл	34,7	Женщины: 30 - 38
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW-CV), %	12,7	11.5 - 14.5
Лейкоциты, •10^9/л	7,20	Женщины: 4 - 9
Тромбоциты, •10^9/л	329	150 - 400
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), фл	10,8	9 - 17
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), %	23,4	13 - 43
Тромбокрит (PCT), %	0,32	0.15 - 0.4
Заключение по гемограмме	Показатели в пределах референсных интервалов	
Внешний путь свертывания крови		

Пациент Пол **женский** Возраст **40**

Заказ

Показатель	Результат	Референсный интервал
Протромбиновое время, сек	12,6	9 - 15
Протромбин по Квику, %	107	85 - 139
МНО	0,96	0.8 - 1.25
Внутренний путь свертывания крови		
АЧТВ, сек	28,8	25 - 37
Образование фибриногена		
Тромбиновое время, сек	15,2	< 21
Фибриноген, г/л	4,0	Небеременные женщины: 2 - 4 Беременные женщины до 20 недель: 2 - 5.3 Беременные женщины 21-28 недель: 3 - 5.7 Беременные женщины 29-34 недели: 3.2 - 5.7 Беременные женщины 35-42 недели: 3.5 - 6.5
Внутрисосудистое свертывание крови и фибринолиз		
РКФМ (растворимые комплексы фибрин-мономеров), •10^-2 г/л	5,0	Небеременные женщины: <4 Беременные женщины: <9
Физиологическая активация внутрисосудистого свертывания крови		
Противосвертывающая система		
Антитромбин III, %	85,1	80 - 120
Активность противосвертывающей системы крови в пределах референсных интервалов		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1117746142172 "ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ЦИР" * МОСКВА *

Врач КДЛ: Синтюрина Н.Н.