ЛАБОРАТОРИИ ЦИР

Лицензия № ЛО-77-01-013791 от 24.01.2017 г.
+7 (495) 514-00-11
cirlab.ru

Результаты исследований

Пациент

Пол **женский** Возраст **25**

Заказ

Показатель	Результат	Референсный интервал
(Не определена)		
[01157] Мутация промотора гена коагуляционного фактора FVII (-312 ins 10bp) rs36208070 - буккальный эпителий		

Гены тромбофилии

Ген	Кодируемый белок	Полиморфизм	Локализация	Результат	Шифр
F7	VII коагуляционный фактор	A1/A2 (rs5742910)	c.-323	A2/A2	3*

В активном состоянии фактор VII взаимодействует с фактором III, что приводит к активации факторов IX и X системы свертывания крови, то есть коагуляционный фактор VII участвует в образовании кровяного сгустка.
Данный полиморфизм включает вставку в 10 п.н. в положении -323 в области промотора гена F7.
Аллель A1 означает отсутствие вставки, а аллель A2 - наличие.
У пациентов с генотипом A2A2 активности активированного фактора VII снижена на 66%.

Частота аллелей: A2 (insCCTATATCCT)=0.20489

Ориентация цепи: плюс

Синонимы: N/ins

* - защитный аллель является более редким.

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатории ЦИР" ОГРН 1117746142172 * Москва * Для документов

Врач КДЛ: Рыськина Н.Н.